

四庫全書薈要

• 乾隆御覽本

子部

欽定四庫全書薈要

子部

內經素問卷十一

十一



黃帝內經素問卷十

唐王冰次注

宋林億等校正

瘡論

刺瘡篇

氣厥論

欬論

瘡論篇第三十五

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰夫瘡瘡皆生於風其畜作有時者何也

瘡猶老也

亦瘦也新校正云按甲乙經云夫瘡疾皆生於風其

以日作以時發何也

與此文異太素同今文楊上善云

瘡有云二日一發名瘡瘡此經但夏傷於暑至秋為病

或云瘡瘡或但云瘡不必以日發間日以定瘡也但應

四時其形有歧伯對曰瘡之始發也先起於毫毛伸欠

異以為瘡爾

歧伯對曰瘡之始發也先起於毫毛伸欠

乃作寒慄鼓頷

慄謂戰慄鼓謂振動

腰脊俱痛寒去則內外皆熱

頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣使然願聞其道歧伯曰

陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也

陽氣者下行極而上陰氣者上

行極而下故曰陰陽上下交爭也陽虛則外寒陰虛則

內熱陽盛則外熱陰盛則內寒由此寒去熱生則虛實

更作陰陽之陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄

氣相移易也

陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄

鼓頷也

陽井於陰言陽氣入於陰分也陽明胃脈也胃之脈自交承漿却分行循頤後下廉出大

迎其支別者從大迎前下人迎故氣不足則惡寒戰慄而顫頷振動也

巨陽虛則腰背

頭項痛

巨陽者膀胱脈其脈從頭別下項循肩膊內俠脊抵腰中故氣不足則腰背頭項痛也

三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內

故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則

喘而渴故欲冷飲也

熱傷氣故內外皆熱則喘而渴

此皆得之夏傷

於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所

舍也

腸胃之外榮氣所主故云榮氣所舍也舍猶居也

此令人汗空疎

新校正云

按全元起本作汗出腠理開因得秋氣汗出遇風及
空疎甲乙經太素同

得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者

晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內

薄內外相薄是以日作作發帝曰其間日而作者何

也問曰謂岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發

陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也不與衛氣相逢

會故隔日發也帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然猶

也日暮岐伯曰邪氣客於風府循膂而下風府穴名在項上入髮際

同身寸之二寸大筋內
宛宛中也脊謂脊兩傍衛氣一日一夜大會於風府

其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每

至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病

作以此日作稍益晏也

節謂脊骨之節然邪氣遠則逢會遲故發暮也

其出

於風府日下一節二十五日下至骶骨二十六日入

於脊內注於伏膂之脈

項已下至尾骶凡二十四節故曰日下一節二十五日下

至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脈也伏膂之脈者謂脊筋之間腎脈之伏行者也腎之脈循股內後廉貫脊屬腎其直行者從脊上貫肝鬲入肺中以其貫脊又不正應行穴但循膂伏行故謂之伏膂脈

新校正云按全元起本二十五日作二十一日二十六日作二十二日甲乙經太素並同伏膺之脉甲

乙經作大衝之脉

其氣上行九日出於缺盆之中其

崇元方作伏衝

氣日高故作日益早也

以腎脉貫脊屬腎上入肺中肺者缺盆為之道其氣之行

速故其氣上行九日出於缺盆之中

其間日發者由邪氣內薄於五藏橫

連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行

不得皆出故間日乃作也

募原謂鬲募之原系新校正云按全元起本募作

膜太素崇元方並同舉痛論亦作膜原

帝曰夫子言衛氣每至於風府

腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其

氣之發也不當風府其日作者柰何歧伯曰

新校正云按全元起

本及甲乙經太素自此邪氣客於頭項至下則病作故八十八字並無

此邪氣客於頭項

循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風

府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至

背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至

手足而病

故下篇各以居邪之所而刺之

衛氣之所在與邪氣相合則

病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所

合則其府也

虛實不同邪中異所衛邪相合病則發焉不必悉當風府而發作也

新校正云按

甲乙經巢元方則其府也作其病作

帝曰善夫風之與瘧也相似同類而

風獨常在瘧得有時而休者何也

風瘧皆有盛衰故云相似同類岐伯

曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沈以內薄

新校正云按甲

乙經作次以內傳

故衛氣應乃作

留謂留止隨謂隨從

帝曰瘧先寒而後

熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因

遇夏氣淒滄之水寒

新校正云按甲乙經太素水寒作小寒迫之

藏於腠理

皮膚之中秋傷於風則病成矣

暑為陽氣中風者陽氣受之故秋傷於風則病

成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風

故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧

露形觸冒則風寒傷之

帝

曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於

寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧

以其先熱其故謂之溫

但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足

熱而欲嘔名曰瘧瘧

瘧熱也極熱為之也

帝曰夫經言有餘者寫

之不足者補之今熱為有餘寒為不足夫瘧者之寒湯

火不能溫也及其熱冰水不能寒也此皆有餘不足之

類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何

也願聞其說

言何暇不早使其
盛極而自止乎

岐伯曰經言無刺熇熇

之熱

新校正云按全元起
本及太素熱作氣

無刺渾渾之脈無刺漉漉之

汗故為其病逆未可治也

熇熇盛熱也渾渾言無端
緒也漉漉言汗大出也

夫

瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無

氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於

外則陰虛而陽實故先熱而渴

陰盛則胃寒故先寒戰
慄陽盛則胃熱故先熱

欲飲也

夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則

寒陽勝則熱瘧者風寒之氣不常也病極則復

復謂復
舊也言

其氣發至極
還復如舊

至

新校正云按甲乙經作瘡者風寒之暴氣不常病極則復至全元起本及太素

作瘡風寒氣也

不常病極則復至至字連上句與王氏之意異

病之發也如火之熱如

風雨不可當也

以其盛熾故不可當也

故經言曰方其盛時必毀

新校正云按太素云勿敢必毀

因其衰也事必大昌此之謂也

方正也正盛寫

之或傷真氣故必毀病氣衰已補其經氣則邪氣弭退正氣安平故必大昌也

夫瘡之未發也

陰未并陽陽未并陰因而調之真氣得安邪氣乃亡

所寫

必中所補必當故真氣得安邪氣乃亡也

故工不能治其已發為其氣逆也

真氣浸息邪氣大行真不勝邪是為逆也

帝曰善攻之柰何早晏何如岐伯

曰瘡之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷

陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得

出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未

得并者也

言牢縛四支令氣各在其處則邪所居處必自見之既見之則刺出其血爾往猶去也

新校正云按甲乙經真往作其往太素作直往

帝曰瘡不發其應何如岐伯曰

瘡氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脈

躁在陰則寒而脈靜

陰靜陽躁故脈亦隨之

極則陰陽俱衰衛氣

相離故病得休衛氣集則復病也

相薄至極物極則反故極則陰陽俱衰

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也

岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失

不能相得故休數日乃作也

氣不相會故數日不能發也

瘡者陰陽

更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

陽勝陰甚則渴陽勝陰不甚則不渴

也勝謂強盛於彼之氣也

帝曰論言夏傷於暑秋必病瘡

新校正云按生氣通

天論并陰陽應象大論二論俱云夏傷於暑秋必病瘡

今瘡不必應者何也

言不

然岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也其以

秋病者寒甚

秋氣清涼陽氣下降熱藏肌肉故寒甚也

以冬病者寒不甚

冬

嚴冽陽氣伏藏不以春病者惡風

與寒爭故寒不甚

春氣溫和陽氣外泄內腠開發故惡於風

以夏病者多汗

夏氣暑熱津液充盈外泄皮膚故多汗也

帝曰夫病溫瘧與

寒瘧而皆安舍舍於何藏

安何也舍居止也藏謂五神藏也

岐伯曰溫

瘧者得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣

大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓燥肌肉消腠理發

泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從

內出之於外也

腎主於冬冬主骨髓腦為髓海上下相應脈熱上熏故腦髓銷燥則熱氣外薄

故肌肉減削而病藏於腎也

如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣

陰虛謂腎

藏氣虛陽盛謂勝於太陽氣盛

衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣

故先熱而後寒名曰溫瘧

衰謂病衰退也復反入謂入腎陰脈中

帝曰瘧

瘧何如岐伯曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝

中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚

之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病

矣其氣不及於陰

新校正云按全元起本及太素作反及之陰巢元方作不及之陰

故

但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消

燄脫肉故命曰痺瘧帝曰善

刺瘡篇第三十六

新校正云按全元起本在第六卷

足太陽之瘡令人腰痛頭重寒從背起足太陽脈從顛

下項循肩膊內俠脊抵腰中其支別者從髀內左右別

下貫肘過臂樞故令腰痛頭重寒從背起 新校正云

接三部九候論注貫肘作貫臂刺腰痛注 先寒後熱

燭燭然足故先寒寒極則生熱故後熱也 不熱止汗

出難已此熱生是為氣虛熱止則為氣復氣復而汗反出

全元起本并甲乙經太素巢元方並刺却中出血之邪

是謂金門金門在足外踝下一名曰闕梁陽維所別屬

也刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯黃帝中誥

圖經云委中主之則古法以委中為郄中也委中在腠中央約文中動脈足太陽脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯新校正云詳刺郄中甲乙經作腠中令王氏兩注之當以腠中為正足

少陽之瘡令入身體解次身體解依如下句寒不甚熱不甚氣

未盛故惡見人見人心惕惕然薄其氣故惡見人見人

然也心惕惕熱多汗出甚邪感則熱多刺足少陽俠谿在足

小指次指歧骨間本節前陷者中少陽之榮刺足陽明可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯

之瘡令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見

日月光火氣乃快然陽虛則外先寒陽虛極則復感故寒甚久乃熱也熱去汗已陰入內

強陽不勝陰故喜見日

刺足陽明跗上

衝陽穴也在足

五寸骨間動脈上去陷谷同身寸之三寸陽明之原足

太陰之瘡令人不樂好太息

心氣流於肺則喜今脾藏

於脾不上行於肺又太陰脈支別者復從

不嗜食多寒

熱汗出

脾主化穀營助四傍今邪薄之諸藏元稟土寄

乙經云多寒少熱

病至則善嘔嘔已乃衰

足太陰脈入

上曷俠咽故病氣來至

即取之

待病衰去即而取之其

也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯足

少陰之瘡令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少

足少陰脈貫肝鬲入肺中

循喉嚨故嘔吐甚多寒熱也腎為陰藏陰氣生寒今陰

氣不足故熱多寒少新校正云接甲乙經云嘔吐甚多寒欲閉戶牖而處其病難已而胃陽明脈病欲獨閉戶牖

少熱欲閉戶牖而處其病難已而胃陽明脈病欲獨閉戶牖

見腎水之中土刑於水故其病難已也太鍾太谿悉主

之太鍾在足內踝後街中少陰絡也刺可入同身寸之

三分留七呼若灸者可灸三壯太谿在足內踝後跟骨

上動脈陷者中少陰俞也刺可入同身寸之三分留七

呼若灸者可灸三壯也新校正云接甲乙經云其病難已取太谿又接太鍾穴甲乙經作跟後街中刺腰痛

篇注作跟後街中動脈水穴注云在內踝後此足厥陰注云內踝後街中諸注不同當以甲乙經為正

之瘡令人腰痛少腹滿小便不利如瘰癧狀非瘰癧也數便

意恐懼氣不足腹中悒悒

足厥陰抵少腹故病如是瘥謂

不得小便也悒悒不暢之貌

新枝正刺足厥陰太衝

云接甲乙經數便意三字作數噫二字

刺足厥陰太衝

在足大指本節後同身寸之二寸陷者可灸三壯也

可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯也

新

校正云接刺腰痛篇注云肺瘡者令人心寒寒甚熱熱

在本節後內間動脈應手

肺瘡者令人心寒寒甚熱熱

間善驚如有所見者刺手太陰陽明

列缺主之列缺在手腕後同身寸之

一寸半手太陰絡也刺可入同身寸之三分留三呼若

灸者可灸五壯陽明穴合谷主之合谷在手大指次指

岐骨間手陽明脈之所過也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯

心瘡者令人煩

心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

神門主之神門在掌後銳

骨之端陷者中手少陰俞也刺可入同身寸之三分留
七呼若灸者可灸三壯

新校正云按太素云欲得消

水及寒多寒肝瘡者令人色蒼蒼然太息其狀若死者
不甚熱甚也

刺足厥陰見血

中封主之中封在足內踝前同身寸之
一寸半陷者中仰足而取之伸足乃得

之足厥陰經也刺出血止常刺者可入同
身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯

脾瘡者令人

寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

商丘主之
商丘在足

內踝下微前陷者中足太陰經也刺可入
同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

腎瘡者令人

洒洒然腰痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太

陽少陰

足太鍾主之取如前
足少陰瘡中法

胃瘡者令人且病也善饑而

不能食食而支滿腹大

胃熱脾虛故善饑而不能食食而支滿腹大也是以下文兼刺

太陰

新校正云按

刺足陽明太陰橫脈出血

厲兌解

太素

且病作疽病

刺足陽明太陰橫脈出血

厲兌解

主之厲兌在足大指次指之端去爪甲如韭葉陽明井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯解

谿在衝陽後同身寸之三寸半腕上陷者中陽明經也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可灸三壯三里

在膝下同身寸之三寸髌骨外廉兩筋肉分間陽明合也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯然

足陽明取此三穴足太陰刺其橫脈出血也橫脈謂足內踝前斜過大脈則太陰之經脈也新校正云詳解

谿在衝陽後三寸半按甲乙瘡發身方熱刺跗上動脈經一寸半氣穴論注二寸半

則陽明開其空出其血立寒陽明之脈多血多氣熱盛之脈也開其空出其血立寒氣壯故出其血而立可寒

也瘡方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰亦謂開穴而

隨井俞而刺之也瘡脈滿大急刺背俞用中鍼傍五腧各一

適肥瘦出其血也瘦者淺刺少出血肥者深刺多出瘡

脈小實急灸脛少陰刺指井灸脛少陰是謂復溜復溜

陷者中足少陰經也刺可入同身寸之三分留三呼若

灸者可灸五壯刺指井謂刺至陰至陰在足小指外側

去爪甲角如韭葉足太陽井也刺可入同瘡脈滿大急

身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯

刺背俞用五腧俞背俞各一適行至於血也謂調適肥

淺循三備法而行鍼令至於血脈也背俞謂大杼五腧

俞謂諛諛主之新校正云詳此條從瘡脈滿大至此

注終文注共五十五字當從刪削經文與次前經文重復王氏隨而注之別無義例不若士安之精審不復出

也瘡脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼緩者中風大為氣實虛者血虛血虛

氣實風又攻之故宜藥治以凡治瘡先發如食頃乃可遺其邪不宜鍼寫而出血也

以治過之則失時也先其發時真邪異居波瀾不起故可治過時則真邪相合攻之則反

傷真氣故曰失時新校正云詳從前瘡脈滿大至此全元起本在第四卷中王氏移續於此也諸瘡

而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小

豆者盡取之十二瘡者其發各不同時察其病形以知

其何脈之病也隨其形證而先其發時如食頃而刺之

一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩脈出血

釋其不已刺郄中盛經出血又刺項已下俠脊者必已

並足太陽之脈氣也郄中則委中也俠脊者謂大杼風

門熱府穴也大杼在項第一椎下兩傍相去各同身寸

之一寸半陷者中刺可入同身寸之三分留七呼若灸

者可灸五壯風門熱府在第二椎下兩傍各同身寸之

一寸半刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸五

壯新校正云詳大杼穴灸五壯按甲乙經作七壯氣

穴論注作七壯刺熱論舌下兩脈者廉泉也廉泉穴名

及熱穴注並作五壯喉上舌本下陰維任脈之會刺可入同

身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺瘡者必先問

其病之所先發者先刺之先頭痛及重者先刺頭上及

兩額兩眉間出血

頭上謂上星百會兩額謂懸顙兩眉間謂攢竹等穴也

先項背

痛者先刺之

項風池風府主之背大抒神道主之

先腰脊痛者先刺郄中

出血先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間

新校正云按別本作

手陰陽全本亦作下陰陽

先足脛痠痛者先刺足陽明十指間出血

各以邪居之所而脫寫之

風瘡瘡發則汗出惡風刺三陽經背俞之

血者

三陽太陽也云按甲乙經云足三陽

新校正

髀痠痛甚按之不可名曰

肘髓病以鏡鍼鍼絕骨出血立已

陽輔穴也取如氣身穴論中府俞法

身

體小痛刺至陰

新校正云按甲乙經無至陰二字

諸陰之井無出血間

日一刺諸井伯在指端足少陰井在足心宛宛中瘡不渴間日而作刺足太

陽新校正云按九卷渴而間日作刺足少陽新校正云按九卷云

手少陽溫瘡汗不出為五十九刺自胃瘡下至此尋黃帝中詰圖經所主或

有不與此文同應古之別法也

氣厥論篇第三十七新校正云按全元起本

黃帝問曰五藏六府寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於肝

癰腫少氣肝藏血然寒入則陽氣不散陽氣不散則血聚氣澀故為癰腫又為少氣也新校正云按全

元起本云腎移寒於脾元起注云腎傷於寒而傳於脾主肉寒生於肉則結為堅堅化為膿故為癰也血傷

氣少故曰少氣甲乙經亦作移寒於脾脾移寒於肝癰

腫筋攣

脾藏主肉肝藏主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急故筋攣也肉寒則衛氣結聚故為癰腫

肝

移寒於心狂隔中

心為陽藏神處其中寒薄之則神亂離故狂也陽氣與寒相薄故隔塞而

通也心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治

心為陽藏

反受諸寒寒氣不消乃移於肺寒隨心火內鑠金精金受火邪故中消也然肺藏消鑠氣無所持故令飲一而溲二也金火相肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅

水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也肺

氣腎主水夫肺寒入腎腎氣有餘腎氣有餘則上奔於肺故云涌水也大腸為肺之府然肺腎俱為寒薄上下

皆無所之故水氣客於大腸也腎受凝寒不能化液大腸積水而不流通故其疾行則腸鳴而濯濯有聲如囊

裏漿而為水病也新校正云按脾移熱於肝則為驚

甲乙經水之病也作治主肺者按肝移熱於心則死兩陽和合

血之則驚而鼻中血出肝移熱於心則死兩陽和合

故肝熱入心則當死也陰陽別論曰肝之心謂之生陽之屬不遇四日而死新校正云按陰陽別論之

文義與此殊王氏不當心移熱於肺傳為鬲消間中有

引彼誤文附會此義斜高膜高膜下際內連於橫高膜故心熱肺移熱於腎

傳為乘症乘謂筋柔而無力症謂骨症而不隨氣骨皆

力腎移熱於脾傳為虛腸辟死不可治脾土制水腎反

脾土不能制水而受病故久久傳為虛損也腸澼死者
腎主下焦象水而冷今乃移熱是精氣內消下焦無主
以守持故腸澼胞移熱於膀胱則瘕溺血之膀胱為津液
除而氣不禁止

納之司故熱入膀胱胞中外熱陰絡內溢故不得小便
便而溺血也正理論曰熱在下焦則溺血此之謂也膀胱

移熱於小腸禹腸不便上為口糜下禹抵胃屬小腸咽

故受熱以下令腸隔塞而不便上小腸移熱於大腸為
則口生瘡而糜爛也糜謂爛也

虛癰為沈伏瘕也血澀不利則月事沈滯而不行故云

為虛癰為沈也虛與伏同瘕一為疰傳為誤也大腸移熱於胃善食而瘦入謂

之食亦肌肉故善食而瘦入也食亦者謂食入移易而

過不生肌膚也亦易也

新校正云按甲乙經入作又王元注云善食而瘦入也殊為無義不若甲乙經作又

讀連下文

胃移熱於膽亦曰食亦

義同

膽移熱於腦則辛頰

鼻淵鼻淵者濁涕下不止也

腦液下滲則為濁涕涕下不止如彼水泉故曰鼻淵也

謂鼻頰也足太陽脈起於目內眥上額交巔入絡腦足陽明脈起於鼻交頰中傍約太陽之脈今腦熱則足

太陽逆與陽明之脈俱盛薄於頰中故鼻頰辛也辛謂酸痛故下文曰

傳為衄蟻瞑目足以

陽明脈交頰中傍約太陽之脈故耳熱盛則陽絡溢則衄出汗血也蟻謂汗血也血出甚陽明太陽脈

衰不能榮養於故得之氣厥也

厥者氣逆也皆由氣逆而得之

欬論篇第三十八

新校正云按全元起本在第九卷

黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五藏六府皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也邪謂寒氣其寒飲食入

胃從肺脈上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客

之則為肺欬

肺脈起于中焦下絡大腸還循胃口上屬肺故云從肺脈上至于肺也

五藏

各以其時受病非其時各傳以與之

時謂王月也非王月則不受邪故各

傳以人與天地相參故五藏各以治時感於寒則受病

微則為欬甚者為泄為痛

寒氣微則外應皮毛內通肺故欬寒氣甚則入于肉肉裂

則痛入於腸
胃則泄痢

乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏

則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之

當以

用事之時故先受邪氣

新校正云按全元起本及太素无乘秋則三字疑此文誤多也

帝曰何以

異之

証也明其

歧伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾

血

肺藏氣而應息故欬則喘息而唾中有聲甚則肺絡逆故唾血也

心欬之狀欬則心

痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺

手心主脈起于胸中出屬心包少陰

之脈起于心

中出屬心系其支別者從心系上俠咽喉故病如是新校正云按甲乙經介介如梗狀作喝喝

又少陰之脈上俠咽不言俠喉肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以

轉轉則兩胛下滿

足厥陰脈上貫膈布脇肋循脾欬之

狀欬則右脇下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬

劇足太陰脈上貫膈俠咽其支別者復從胃別上膈故

病如是也脾氣連肺故痛引肩背也脾氣主右故右

胛下陰陰然腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎

深慢痛也足少陰脈上股內后廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者從

腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本又膀胱脈從肩髃

內別下俠脊抵腰中入循脊絡腎故病如是帝曰六府之欬柰何安所受病

岐伯曰五藏之久欬乃移於六府脾欬不已則胃受之

胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出

脾與胃合又胃之脈循喉嚨入缺盆下膈

屬胃絡脾故脾欬不已胃受之也胃
寒則嘔嘔甚則腸氣逆上故衄出肝欬不已則膽受

之膽欬之狀欬嘔膽汁肝與膽合又膽之脈從缺盆以下胸中貫鬲絡肝故肝欬不已

膽受之也膽氣好肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬
逆故嘔出苦汁也

而遺失肺與大腸合又大腸脈入缺盆絡肺故肺欬不已大腸受之大腸為傳送之府故寒入則氣不

禁馬新校正云按心欬不已則小腸受之小腸欬狀
甲乙經遺失作遺矢

欬而失氣氣與欬俱失心與小腸合又小腸脈入缺盆絡心故心欬不已小腸受之小

腸寒盛氣入大腸欬則腎欬不已則膀胱受之膀胱欬
小腸氣下奔故失氣也

狀欬而遺溺腎與膀胱合又膀胱脈從肩髃內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱故腎欬不已膀胱

脫受之勝脫為津液之府是故遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬

而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而

面浮腫氣逆也三焦者非謂手少陽也正謂上焦中焦耳何者上焦者出于胃上口並咽以上

貫高布胸中走腋中焦者亦至于胃口出上焦之后此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脈乃化

而為血故言皆聚於胃關於肺也兩焦受病則邪氣重肺而肺氣滿故使人多涕唾而面浮腫氣逆也腹滿不

欲食者胃寒故也胃脈者從缺盆下乳內廉下脘腹至氣街其支者復從胃下口循腹裏至氣街中而合今胃

受邪故病如是也何以明其不謂下焦然下焦者別於回腸注於膀胱故水穀者常并居於胃中或糟粕而俱

下於大腸泌別過循下焦而滲入膀胱尋此行化乃與胃口懸遠故不謂此也新校正云按甲乙經胃脈下

循腹作
下伏齊

帝曰治之柰何歧伯曰治藏者治其俞治府者

治其合浮腫者治其經

諸諸藏俞者皆脈之所起第三穴

也經者藏脈之所起第四穴府脈之所起第五穴甲乙經曰脈之所注為俞所行為經所入為合此之謂也

帝曰善

黃帝內經素問卷十

黃帝內經素問卷十音釋

瘧論

火沃切

漉

鹿音

弭

赫婢切

刺瘧論

喝

音悒

於急切

氣厥論

瘧

音麋

武悲切

處

音賤

莫結切

欬論

虺

音回

黃帝內經素問卷十音釋

黃帝內經素問卷十一

唐王冰次注

宋林億等校正

舉痛論

腹中論

刺腰痛篇

舉痛論篇第三十九

新校正云按全元起本在第三卷名五藏舉痛所以名舉痛之義未

詳按本篇乃黃帝問五藏卒痛之疾疑舉乃卒字之誤也

黃帝問曰余聞善言天者必有驗於人善言古者必有

合於今善言人者必有厭於己如此則道不感而要數

極所謂明也

善言天者言天四時之氣溫涼寒暑生長收藏在人形氣五藏參應可驗而指示善

惡故曰必有驗於人善言古者謂言上古聖人養生損益之道與今養生損益之理可合而與論成敗故曰必

有合於今也善言人者謂言形骸骨節更相枝拄筋脈束絡皮肉包裹而五藏六腑次居其中假七神五藏而

運用之氣絕神去則之於死是以知彼浮形不能堅久靜慮於己亦與彼同故曰必有厭於己也夫如此者是

知道要數之極悉無疑惑今余問於夫子令言而可知

深明至理而乃能然矣

視而可見捫而可得令驗於己而發蒙解惑可得而聞

乎言如發開童蒙之耳解於疑惑者之心令一條理而目視手循驗之可得捫猶循也岐伯再

拜稽首對曰何道之問也

請示問端也

帝曰願聞人之五藏卒痛

何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與少腹相引而痛者或腹痛引陰股者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人有

少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不

通者凡此諸痛各不同形別之奈何欲明異候之所起歧伯曰寒

氣客於脈外則脈寒脈寒則縮踈縮踈則脈絀急絀急則外引

小絡故卒然而痛得炅則痛立止脈左右環故得寒則縮踈而絀急縮踈絀

急則衛氣不得通流故外引於小絡脈也衛氣不入寒內薄之脈急不縱故痛生也得熱則衛氣復行寒氣退

辟故痛止炅因重中於寒則痛久矣重寒難釋故寒氣客熱也止已也

於經脈之中與炅氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也按之痛甚

者其義寒氣稽留炅氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不具下文

可按也則邪氣攻內故不可按也寒氣客於腸胃之間

膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按

之痛止膜謂鬲間之膜原謂鬲育之原血不得散謂鬲

生也手按之則寒氣散小絡緩故痛止寒氣客於俠脊之脈則深按之不

能及故按之無益也俠脊之脈者當中督脈也次兩傍

者貫脊筋故深按之不能及也若按當中則脊節曲按

兩傍則脊筋盛合曲與臑合皆衝氣不得行過寒氣益聚而內畜故寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上

按之無益寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣

脈衝

奇經脈也。闕元穴名在齊下三寸，言起自此穴，即隨腹而上，非生出於此也。其本生出乃起於腎下也。直上者，謂上行會於咽喉也。氣因之，謂衝脈不通，足少陰氣因之上滿，衝脈與少陰並行，故喘動應於手也。寒氣客於背俞之脈，則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛。其俞注於心，故相引而痛。按之則熱，氣至熱，氣至則痛止矣。俞

謂心俞脈亦足太陽脈也。夫俞者皆內通於藏，故曰其俞注於心，相引而痛也。按之則溫，氣入溫，氣入則心氣外發，故寒氣客於厥陰之脈，厥陰之脈者絡陰器繫於

痛止

肝寒氣客於脈中，則血泣，脈急，故脇肋與少腹相引痛。

矣。厥陰者肝之脈，入髀中環陰器，抵少腹，上貫肝鬲布脇肋，故曰絡陰器繫於肝，脈急引脅與少腹痛也。

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故腹痛

引陰股

亦厥陰肝脈之氣也以其脈循陰股入髀中環陰器上抵少腹故曰厥氣客於陰股寒氣上及

於少腹也寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注

於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

言血為寒氣之所凝

結而乃成積

寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故

卒然痛死不知人氣復反則生矣

言藏氣被寒擁胃而不行氣復得通則已

也新校正云詳注中擁胃疑作擁胃

寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而

嘔也

腸胃客寒留止則陽氣不得下流而反上行寒氣寒不去則痛生陽上行則嘔噦故痛而嘔也

客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣

小腸為受盛之府中滿則

寒邪不居故不得結聚而傳下入於迴腸迴腸廣腸也為傳導之府物不得停留故後泄而痛熱氣留

於小腸腸中痛瘕熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不

通矣

熱滲津液故便堅也

帝曰所謂言而可知者也視而可見柰

何謂也岐伯曰五藏六府固盡有部

謂面上分部視其五色

黃赤為熱

中熱則色黃赤

白為寒

陽氣少血不上榮於色故白

青黑為痛

凝

泣則變惡故此所謂視而可見者也帝曰捫而可得奈

色青黑則痛

何

捫摸也以手循摸也

岐伯曰視其主病之脈堅而血及陷下者

皆可捫而得也帝曰善余知百病生於氣也

夫氣之為用虛實逆

順緩急皆能為病故發此問端

怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣

下寒則氣收炆則氣泄驚則氣亂

新校正云按太素驚作憂

勞則氣

耗思則氣結九氣不同何病之生岐伯曰怒則氣逆甚

則嘔血及飧泄

新校正云按甲乙經及太素飧泄作食而氣逆

故氣上矣

怒則陽氣

逆上而肝氣乘脾故甚則嘔血及飧泄作何以明其然怒則面赤甚則色蒼靈樞經曰盛怒而不止則傷志明

怒則氣逆上而不下也

喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣

氣脈和調

故志達暢榮衛通利故氣徐緩

悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮

衛不散熱氣在中故氣消矣

布葉謂布蓋之大葉

新

而上焦不通作兩焦不通又王注肺布葉舉謂布蓋之大葉疑非全元起云悲則損于心心系急則動於肺肺

氣繫諸經逆故肺布而葉舉安得謂肺布為肺布蓋之大葉

恐則精却却則上焦閉

閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣

恐則陽精却却則上

焦閉也上焦既閉氣不行流下焦陰氣亦還迴不散而聚為脹也然上焦固禁下焦氣還各守一處故氣不行

也

新校正云詳氣

寒則腠理閉氣不行故氣收矣

腠

津液滲泄之所理謂文理逢會之中閉謂密閉氣謂衛氣行謂流行收謂收斂也身寒則衛氣沈故皮膚文理

及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂於中而不發散也

新校正云按甲乙經氣不行作營衛不行

吳則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄

人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠

開發榮衛大通津液外泄而汗大泄也

驚則心無所倚神無所歸慮無所

定故氣亂矣

氣奔越故不調理校正云按太素驚作憂

新勞則喘息汗出外

內皆越故氣耗矣

疲力役則氣奔達故喘息氣奔達則陽外發故汗出然喘且汗出內外皆

踰越於常紀故氣耗損也

思則心有所存神有所歸正氣留而不行

故氣結矣

繫心不散故氣亦停留云按甲乙經歸正二字作止字

新校正

腹中論篇第四十

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰有病心腹滿旦食則不能暮食此為何病岐

伯對曰名為鼓脹

心腹脹滿不能再食形如鼓脹故名

鼓脹也新校正云按太素鼓作載

帝曰治之奈何歧伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已

按古本草雞矢並不治鼓脹惟大利小便微寒今方制法當取用處湯漬服之

帝曰其時有復

發者何也

復謂再發言如舊也

歧伯曰此飲食不節故時有病也

雖然其病且已時故當病氣聚於腹也

飲食不節則傷胃胃脹者脘腹

裏而下行故飲食不節時有病者復病氣聚於腹中也

帝曰有病胸脇支滿者妨

於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩

時時前後血病名為何何以得之
清涕清涕者謂從竅

漏中浸液而下水出清冷也眩謂目視眩轉也前後血謂前陰後陰出血也

歧伯曰病名血

枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷

故月事衰少不來也

吐血多者謂之脫血漏下鼻衄嘔

脈盛則內熱因而入房髓液皆下故腎中氣竭也肝藏血以少大脫血故肝傷也然於丈夫則精液衰乏女子則月事衰少而不來帝曰治之奈何復以何術歧伯曰以四烏鰂

骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為

後飯飲以鮑魚汁利腸中

新校正云按別本一作傷中

及傷肝也

後飯

藥先謂之後飯按古本草經云烏鰂魚骨蘆茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起爾夫醉勞力以

入房則腎中精氣耗竭月事衰少不至則中有惡血淹留精氣耗竭則陰萎不起而無精惡血淹留則血痺著中而不散故先茲四藥用入方焉古本草經曰烏鰂魚骨味鹹冷平無毒主治女子血閉蘆茹味辛寒平有小毒主散惡血雀卵味甘溫平無毒主治男子陰痿不起強之令熱多精有子鮑魚味辛臭溫平無毒主治瘀血血痺在四支不散者尋文會意方義如此而處治之也

新校正云按甲乙經及太素蘆茹作藎茹詳王注性味

乃藎茹當改蘆作藎又按本草烏鰂魚骨冷作微溫雀卵甘作酸與王注異

帝曰病有少腹

盛上下左右皆有根此為何病可治不歧伯曰病名曰

伏梁

伏梁心之積也伏梁大異病有名同而實異者非一如此之類是

新校正云詳此伏梁與心積之

也帝曰伏梁何因而得之歧伯曰裏大膿血居腸胃之

外不可治治之每切按之致死帝曰何以然歧伯曰此

下則因陰必下膿血上則迫胃脘生馬俠胃脘內癰正

衝脈帶脈之部分也帶脈者起於季脇迴身一周橫絡
於齊下衝脈者與足少陰之絡起於腎下出於氣街循
陰股其上行者出齊下同身寸之三寸闕元之分俠齊
直上循腹各行會於咽喉故病當其分則少腹盛上下
左右皆有根也以其上下堅盛如有潛梁故曰病名伏
梁不可治也以裏大膿血居腸胃之外按之痛悶不堪
故每切按之致死也以衝脈下行者絡陰上行者循腹
故也上則迫近於胃脘下則因薄於陰器也若因薄於
陰則便下膿血若迫近於胃則病氣上出於馬復俠胃
脘內長其癰也何以然哉以本有大膿血在腸胃之外
故也生當為出傳文誤也新此久病也難治居齊上
校正云按太素俠胃作使胃

為逆居齊下為從勿動亟奪

若裏大膿血居齊上則漸傷心藏故為逆居齊下則

去心稍遠猶得漸攻故為從從順也亟數也論在刺法奪去也言不可移動但數數去之則可矣

中今經帝曰人有身體髀股胛皆腫環齊而痛是為何

亡

病岐伯曰病名伏梁

此二十六字錯簡在奇病論中若不有此二十六字則下大無據也

新校正云詳此並無注此風根也

此四字此篇本有其奇病論中亦有之

氣溢於大腸而著於育育之原在齊下故環齊而痛也

不可動之動之為水溺瀦之病

亦衝脈也齊下謂臍臑在齊下同身寸之二寸

半靈樞經曰育帝曰夫子數言熱中消中不可服高梁之原名曰臍臑

芳草石藥石藥發瘕芳草發狂

多飲數溲謂之熱中多食數溲謂之消中多喜

曰瘕多怒曰狂芳美味也

夫熱中消中者皆富貴人也今禁高粱是

不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其說

者熱中消中者脾氣之

上溢甘肥之所致故禁食高粱芳美之草也通評虛實論曰凡治消瘕甘肥實人則高粱之疾也又奇病論曰

夫五味入於口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥

也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消渴此之謂也夫富貴人者驕恣縱欲輕人而無能禁之

禁之則逆其志順之則加其病帝思難詰故發問之高膏梁米也石藥英乳也芳草濃美也然此五者富貴人

常服之難禁也歧伯曰夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣

急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者

脾氣溢而生病氣美

則重盛於脾消熱之氣躁疾氣悍則又滋其熱若人性
和心緩氣候舒勻不與物爭釋然寬泰則神不躁迫無
懼內傷故非緩心和人不可以服此二者悍利也堅定
也固也勁剛也言其芳草石藥之氣堅定固久剛烈而
卒不歇滅此帝曰不可以服此二者何以然歧伯曰夫
二者是也

熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾

慄疾也脾者土

也而惡木服此藥者至甲乙日更論

熱氣慄盛則木氣餘故心非和緩

則躁怒數起躁怒數起則熱氣因木以傷脾帝曰善有
甲乙為木故至甲乙日更論脾病之增減也

病膺腫

新校正云按甲乙經作癰腫

頸痛胸滿腹脹此為何病何以

得之

前也胸膈也頸項

岐伯曰名厥逆

氣逆所生故名厥逆

帝曰治

之奈何岐伯曰灸之則瘖石之則狂須其氣并乃可治

也石謂以石鍼開破之帝曰何以然岐伯曰陽氣重上有餘於上

灸之則陽氣入陰入則瘖石之則陽氣虛虛則狂灸之則火

氣助陽陽盛故入陰石之則陽氣出陽氣出則內不足故狂

須其氣并而治之可使

全也

并謂并合也待自并合則兩氣俱全故可治若不爾而灸石之則偏致勝負故不得全而瘖狂也

帝曰善何以知懷子之且生也岐伯曰身有病而無邪

脈也

病謂經閉也脈法曰尺中之脈來而斷絕者經閉也月水不利若尺中脈絕者經閉也今病經閉脈

反如常者婦人妊娠之證
故云身有病而無邪脈

帝曰病熱而有所痛者何也

岐伯曰病熱者陽脈也以三陽之動也人迎一盛少陽

二盛太陽三盛陽明入陰也夫陽入於陰故病在頭與

腹乃臍脹而頭痛也帝曰善

新校正云按六節藏象論人迎一盛病在少陽二

盛病在太陽三盛病在陽明與此論同人按甲乙經三盛陽明無入陰也三字

刺腰痛篇第四十一

新校正云按全元起本在第六卷

足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如重狀

足太陽脈別下項循肩膊

內俠脊抵腰中別下貫腎故令人腰痛引項脊尻背如重狀也

新校正云按甲乙經貫腎作貫脾刺瘡注亦

作貫脾三部九

刺其郄中太陽正經出血春無見血

中郄

委中也在膝後屈處腠中央約文中動脈足太陽脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三

壯太陽合腎腎王於冬水

少陽令人腰痛如以鍼刺其

皮中循循然不可以俛仰不可以顧

橫足少陽脈達髀際

腰痛如以鍼刺其皮中循循然不可以俛仰少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手陽明之前至肩

上交出手少陽之後其支別者目銳眥下入大迎合手少陽於頰下加頰車下頸合缺盆故不可以顧

新校

正云按甲乙經行手陽明刺少陽成骨之端出血成骨

在膝外廉之骨獨起者夏無見血

成骨謂膝外近下節骨上端兩起骨相並

間陷容指者也。肱骨所成柱膝髀骨故謂之成骨。陽明也。少陽合肝肝王於春木衰於夏故無見血也。

令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲。足陽明脈起於鼻交頰中下循

鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頰後下廉出大迎其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆又其支別者起胃口下循腹裏至氣街中而合以下刺脾故令人腰痛不可顧顧如有見者陽虛故悲也。

陽明於肱前三病上下和之出血秋無見血。按內經中

經陽明脈穴俞之所主此腰痛者悉刺肱前三病則正三里穴也三里穴在膝下同身寸之三寸肱骨外廉兩

筋肉分間刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯陽明合脾脾王長夏土衰於秋故秋無見血新

校正云按甲足少陰令人腰痛痛引脊內廉足少陰脈乙經肱作肱

廉貫脊屬腎故令人腰痛引脊內廉也新校正云按全元起本脊內廉作脊內痛太素亦同此前少足太

陰腰痛證并刺足太陰法應古文脫簡也刺少陰於內踝上二脗春無見血

出血太多不可復也按內經中腧流注圖經少陰脈穴俞所主此腰痛者當刺內踝上則

正復溜穴也復溜在內踝後上同身寸之二寸動脈陷者中刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯

厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓弩弦足厥陰脈自陰股環陰器抵少

腹其支別者與太陰少陽結於腰髀下俠脊第三第四骨空中其穴即中髀下髀故腰痛則中如張弓弩之弦

也如張弦者刺厥陰之脈在腓踵魚腹之外循之累累言強急之甚

然乃刺之腓踵者言脈在腓外側下當足跟也腓形勢如卧魚之腹故曰魚腹之外也循其分均有

血絡累累然乃刺出之此正當蠲溝穴分足厥陰之絡
在內踝上五寸別走少陽者刺可入同身寸之二分留
三呼若灸者可灸三壯厥陰一經作居陰是傳寫草書
厥字為居也新校正云按經云厥陰之脈令人腰痛
次言刺厥陰之脈注言刺厥陰之絡經其病令人善言
注相違疑經中脈字乃絡字之誤也

默然不慧刺之三疝

厥陰之脈循喉嚨之後上入頰
頰絡於舌本故病則善言風盛

則昏冒故不夾慧也三刺其處腰痛乃除

新校正云
按經云善言默然不慧詳善言與默然二病難相兼

全元起本無善字於義為允又按甲乙經厥陰之脈不
絡舌本王氏於素問之中五處引注而注厥論與刺熱
及此三篇皆云絡舌本注風論注痺論二解脈令人腰
篇不言絡舌本蓋王氏亦疑而兩言之也

痛痛引肩目眈眈然時遺洩

解脈散行脈也此足太陽之經起
別行也

於目內眥上額交顛上循肩髃俠脊抵腰中入循督絡
腎屬膀胱下入臍中故病斯候也又其支別者從髀內

別下貫脾循髀外後廉而下合於臍
刺解脈在膝筋肉

中兩脈如繩之解股故名解脈也
分間郤外廉之橫脈出血血變而止
膝後兩傍大筋雙

間橫文之處勢肉高起則郤中之分也古中誥以臍中
為太陽之郤當取郤外廉有血絡橫見迢然紫黑而盛

滿者乃刺之當見黑血必候其血色變赤乃止血不
赤極而寫之必行血色變赤乃止此太陽中經之為腰

痛解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐
足太陽之

也別下循背脊至腰而橫入髀外後廉而下合臍中故
若引帶如折腰之狀
新校正云按甲乙經如引帶作

如裂善恐
刺解脈在郤中結絡如黍米刺之血射以黑

見赤血而已

却中央則委中穴足太陽合也在膝後屈處

分留七呼若矢者可矢三壯此經刺法也今則取其結絡大如黍米者當黑血箭射而出見血變赤然可止也

新校正云按全元起云有兩同陰之脈令人腰痛痛如解脈病源各異恐誤未詳

小錘居其中怫然腫足少陽之別絡也並少陽經上行去足外踝上同身寸之五寸乃別

走厥陰並經下絡足跗故曰同陰脈也怫然也言刺同腫如嗔怒也

陰之脈在外踝上絕骨之端為三痛絕骨之端如前同身寸之三分陽輔

穴也足少陽脈所行刺可入同身寸陽維之脈令人腰

之五分留七呼若矢者可矢三壯痛痛上怫然腫陽維起於陽則太陽之所刺陽維之脈

脈與太陽合膈下間去地一尺所

太陽所生與正經並行而上至膈下復與

太陽合而上也膈下去地正同身寸之一尺是則承光穴在銳膈腸下肉分間陷者中刺可入同身寸之七分若灸者可灸五壯以其取膈腸下肉分間故云合膈下間
新校正云按穴之所在乃承山穴非承光也山字誤為
衡絡之脈令人腰痛不可以俛仰仰則恐仆得之

舉重傷腰衡絡絕惡血歸之

自衡橫也謂太陽之外也絡自腰中橫入髀外後廉而

下與中經合於腠中者今舉重傷腰則橫絡絕中經獨盛故腰痛不可以俛仰矣一經作衡絕之脈傳寫魚魯之誤也若是衡脈中詰不應
刺之在郄陽筋之間上郄

數寸衡居為二疳出血

橫居二穴謂委陽殷門平視橫相當也郄陽謂浮郄穴上側委

陽穴也筋之間謂膝後腘上兩筋之間殷門穴也二穴
各去脛下橫文同身寸之六寸故曰上郤數寸也委陽
刺可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯殷門
刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯故曰
衛居為二痛新校正云詳王氏云浮郤穴上側委陽
穴也按甲乙經委陽在浮郤穴下一寸不得言上側也
會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲
飲已欲走曰會陰之脈其經自腰下行至足今陽氣大
盛故痛上漯然汗出汗液既出則腎氣復生陰虛故汗乾令
人欲飲水以救腎也水入腹已腎氣復生陰氣流行太
陽又盛故飲水刺直陽之脈上三痛在蹻上郤下五寸
已反欲走也

橫居視其盛者出血直陽之脈則太陽之脈俠脊下
貫脛下至腘中下循腓過外踝之

後條直而行者故曰直陽之脈也躄為陽躄所生申脈
穴在外踝下也却下則臑下也言此刺處在臑下同身

寸之五寸上承郄中之穴下當申脈之位是謂承筋穴
即臑中央如外陷者中也太陽脈氣所發禁不可刺可

灸三壯今云刺者謂刺其血絡之盛滿者也兩臑皆有
太陽經氣下行當視兩臑中央有血絡盛滿者乃刺出

之故曰視其盛者出血新校正云詳上云會陰之脈
令人腰痛此云刺直陽之脈者詳此直陽之脈即會陰

之脈也文變而事則不殊又承筋穴注云臑中飛陽之
央如外按甲乙經及骨空論注無如外二字

脈令人腰痛痛上怫怫然甚則悲以恐是陰維之脈也
去內踝上同身

寸之五寸臑分中並少陰經而上也少陰之脈前則陰
維脈所行也足少陰之脈從腎上貫肝鬲入肺中循喉

寵俠舌本其支別者從肺出絡心注胸中故刺飛陽之
甚則悲以恐也恐者生於腎悲者生於心

脈在內踝上五寸

臣億等按甲少陰之前與陰維之會

內踝後上同身寸之五寸復溜穴少陰脈所行刺可入

同身寸之三分內踝之後築賓穴陰維之郄刺可入同

身寸之三分若灸者可灸五壯少陰之前陰維之會以

三脈會在此穴位分也刺可入同身寸之三分若灸者

可灸五壯今中誥經文正同此法

臣億等按甲乙經足

太陽之絡別走少陰者名曰飛揚在外踝上七寸又云

築賓陰維之郄在內踝上腓分中復溜穴在內踝上二

寸今此經注都與甲乙不合者疑經注中五寸字當作

二寸則素問與

甲乙相應矣

昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眈眈然

甚則反折舌卷不能言

陰蹻脈也陰蹻者足少陰之別

也起於然骨之後上內踝之上

直上循陰股入陰而循腹上入胸裏入缺盆上出人迎

之前入頰內廉屬目內眥合於太陽陽蹻而上行故腰

痛之狀
如此

刺內筋為二疳在內踝上大筋前太陰後上踝

二寸所

內筋謂大筋之前分肉也太陰後大筋前即陰

陰前太陰後筋骨之間陷者之中刺可入同身寸之
四分留五呼若灸者可灸三壯今中誥經文正主此散

脈令人腰痛而熱熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚

則遺洩

散脈足太陰之別也散行而上故以名焉其脈
循股內入腹中與少陰少陽結於腰髀下骨空

中故病則腰下如有橫木居其中甚乃遺洩也刺散脈在膝前骨肉分間絡外

廉束脈為三疳

謂膝前內側也骨肉分謂膝內輔骨之
下下廉腓肉之兩間也絡外廉則太陰

之絡色青而見者也輔骨之下後有大筋擷束膝前
骨令其連屬取此筋骨繫束之處脈以去其病是曰地

機三刺而已故曰肉里之脈令人腰痛不可以效效則

束脈為之三病也

維肉里之脈氣所發也里裏也

刺肉里之脈為二病

在太陽之外少陽絕骨之後分肉主之一經云少陽絕

前足少陽脈所行絕骨之後陽維脈所過故指曰在太

陽之外少陽絕骨之後也分肉穴在足外踝直上絕骨

之端如後同身寸之二分筋肉分間陽維脈氣所發刺

可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯新校

正云按分肉之穴甲乙經不見與氣穴注兩出而分寸

不同氣穴注二分作三分五分作三分十呼作七呼

腰痛俠脊而痛至頭几几然目眈眈欲僵仆刺足太陽

郄中出血

郄中委中按太素作頭沈沈然

腰痛上寒刺足太陽

陽明上熱刺足厥陰不可以俛仰刺足少陽中熱而喘

刺足少陰刺郤中出血

此法玄妙中誥不同莫可窺測當用知其應不爾皆應先去血

絡乃調之也

腰痛上寒不可顧刺足陽明

上寒陰市主之陰市在膝上同身寸

之三寸伏兔下陷者中足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯不可顧三里主之

三里在膝下同身寸之三寸肝外廉兩筋肉分間足陽明脈之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者

可灸上熱刺足太陰地機主之地機在膝下同身寸之三壯上熱刺足太陰地機主之地機在膝下同身寸之三壯

寸之三分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經作五壯中熱而喘刺足少陰涌泉

悉主之涌泉在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸

三壯太鍾在足跟後街中動脈足少陰之絡刺可入同
身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯新枝正云按
刺瘡注太鍾在內踝後街中水穴論注在內踝後此注
在跟後街中動脈三注不同甲乙經亦云跟後街中當

從甲乙大便難刺足少陰涌泉少腹滿刺足厥陰太衝
經為正大

在足大指本節後內間同身寸之二寸陷者中脈動應
手足厥陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留十呼

若灸者可如折不可以俛仰不可舉刺足太陽如折束
灸三壯

不可以俛仰京骨崑崙悉主之不可舉申脈僕參悉主
之束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太

陽脈之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者
可灸三壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按

而得之足太陽脈之所過也刺可入同身寸之三分留
七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後跟骨上陷者

中細脈動應手足太陽脈之所行也刺可入同身寸之
五分留十呼若灸者可灸三壯申脈在外踝下同身寸
之五分容爪甲陽蹻之所生也刺可入同身寸之六分
留十呼若灸者可灸三壯僕參在跟骨下陷者中足太
陽陽蹻二脈之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸
者可灸三壯新校正云按甲乙經申脈在外踝下陷
者中無五分字刺入六分作三分留十呼作留六
呼氣穴注作七呼僕參留七呼甲乙經作六呼引脊

內廉刺足少陰

復溜主之取同飛陽注從腰痛上寒不
可顧至此件經語除注並合朱書
新

校正云按全元起本及甲乙經并太素自腰痛上寒至
此並無乃王氏所添也今注云從腰痛上寒至此並合

朱書十九字非王冰
之語蓋後人所加也

腰痛引少腹控眇不可以仰

新校正云

按甲乙經作刺腰尻交者兩髀腫上以月生死為痛數
不可以使仰

發鍼立已

此邪客於足太陰之絡也。控通引也。眇謂季

傍四骨空左右八穴。俗呼此骨為八膠骨也。此腰痛取

腰髀下第四膠即下髀穴也。足太陰厥陰少陽三脈左

右交結於中。故曰腰尻交者也。兩髀腫謂兩髀骨下堅

起肉也。腫上非腫之上。巔正當刺。腫肉矣。直刺。腫肉即

腫上也。何者。腫之上巔別有中脊肉。俞白環俞雖並主

腰痛。考其形證。經不相應矣。髀骨即腰脊兩傍起骨也。

俠脊兩傍腰髀之下各有腫肉。隴起而斜趨於髀骨之

後。內承其髀。故曰兩髀腫也。下承髀。腫肉左右兩腫各

有四骨空。故曰上髀次髀中髀下髀。上髀當髀骨下陷

者中餘三髀。少斜下按之陷中是也。四空悉主腰痛。唯

下髀所主文與經同。即太陰厥陰少陽所結者也。刺可

入同身寸之二寸。留十呼。若灸者。可灸三壯。以月生死

為病數者。月初向圓為月生。月半向空為月死。死月刺

少生月。刺多。繆刺論曰。月生一日一痛。二日二痛。漸多。

之十五日十五痛十六日十四痛
漸少之其痛數多少如此即知也
左取右右取左左痛在
取右痛在右針取左所以然者以其脈左右交結於尻
骨之中故也
新校正云詳此腰痛引少腹一節與
刺論
重

黃帝內經素問卷十一

黃帝內經素問卷十一音釋

舉痛論泣而

音

絀急

骨上切

腹中論鱗

昨則切

薦茹

居上切

下音

腠

上蒲沒切

瘡

陰音

刺膏痛論厭

於切

髀

苦瓦切

膠

音

踴

丑用切

蟲溝

上盧啟切

嘿

音

小錘

直垂切

潔

他合切

髌

格嫁切

頰

虎結切

眇

亡表切

落戈切

嘿

音

小錘

直垂切

潔

他合切

黃帝內經素問卷十一音釋

謹案卷十第四頁前八行邪氣之所合則其府也

按吳崐本合作舍

第五頁後三行未可治也按張志聰本治作刺

第九頁前六行俠谿在足小指次指歧骨間刊本

政訛政據氣穴論注改

第十二頁前三行背俞謂大杼按水熱穴論注以

風門熱府為背俞刺熱論注謂明堂中腧圖經

不言背俞未詳何處此及氣穴論注又以大杼

為背俞注說凡三異附識于此

第十三頁前三行相去各同身寸之一寸半刊本一訛二據刺熱論注改

第十四頁前五行按全元起本刊本元訛示今改第十六頁後八行肉裂則痛刊本肉訛內據痺論注改

第十七頁前七行按甲乙經刊本甲訛用今改

第十七頁後五行屬腎刊本腎訛月又從肩髃內

別下刊本膽訛不並據靈樞經改

第十七頁後八行入缺盆刊本缺訛夫據靈樞經
改

第十八頁前一行絡脾刊本絡訛各據靈樞經改
第十八頁前二行肝與膽合又膽之脉從缺盆以
下胸中刊本膽訛斗脉訛永並據經文及靈樞
經改

第十八頁前六行又小腸脉入缺盆絡心刊本脉

訛永缺訛夫各訛絡並據經文及靈樞經改

第十八頁後五行關於肺也刊本關於閉又故使
人多涕唾刊本多涕唾訛作子又抵又腹滿不
欲食者刊本腹訛月並據經文改

卷十一第二頁後三行則外引小絡按吳崐本則
字上有絀急二字

第四頁後五行固盡有部按吳崐本固作面以注
文推之似作面字為是

第六頁前四行氣奔速則陽外發刊本缺發字據
別本補

第七頁後五行烏鰂魚骨刊本鰂訛二據經文及
本草改

第九頁前四行甘肥貴人按通評虛實論無甘字
第十三頁後五行小錘作小鍼刊本錘訛中據經
文改


第十四頁前一行太陽所生刊本生訛主據李時

珍奇經八脉考所引王永注改

第十五頁後七行起於然骨之後按靈樞經及奇經八脉考然骨並作然谷

音釋第一頁前二行鰾昨則切刊本鰾字訛作則魚二字據本篇文改

第一頁前四行嘿音墨刊本墨訛黑據集韻改



總校官候補中書臣吳紹潔

校對官庶吉士臣何思鈞

謄錄監生臣茹灃

欽定四庫全書薈要

子部

內經素問卷十二
至

四



詳校官主事臣陳木

黃帝內經素問卷十二

唐王冰次註

宋林億等校正


風論

痺論

痿論

厥論

風論篇第四十二

新校正云按全元起本在第九卷

黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中

或為癘風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或

內至五藏六府不知其解願聞其說傷謂人岐伯對曰

風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄腠理開疎則邪風入風氣

入已玄府閉封故內不得通外不得泄也風者善行而數變腠理開則洒然

寒閉則熱而悶洒然寒貌悶不真貌腠理開則風其寒

也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怵慄而不能食

名曰寒熱寒風入胃故食飲衰熱氣內藏故消肌肉寒熱相合故怵慄而不能食名曰寒熱也怵慄

卒振寒貌風氣與陽明入胃循新校正云詳怵慄全

元起本作失味甲乙經作解依

脉而上至目內皆其人肥則風氣不得外泄則為熱中

而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出

陽明者胃脉也胃脉

起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中選出俠口環脣下
交承漿却循頤後下廉循喉嚨入缺盆下膈屬胃故與
陽明入胃循脉而上至目內皆也人肥則腠理密緻故不
得外泄則為熱中而目黃人瘦則腠理開疎風得外泄
則寒中而泣出也風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間

與衛氣相干其道不利故使肌肉憤脹而有瘍衛氣有

所凝而不行故其肉有不仁也

肉分之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行於肉

分之間故氣道澀而不利也氣道不利風氣內攻衛氣
相持故肉憤脹而瘡出也瘍瘡也若衛氣被風吹之不

得流轉所在偏併凝而不行則肉有不
仁之處也不仁謂痛而不知寒熱痛癢
癰者有榮氣熱

肘其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰

吹則風入於經

脉之中也榮行脉中故風入脉中內攻於血與榮氣合
合熱而血脉壞也其氣不清言潰亂也然血脉潰亂榮
復扶風陽脉盡上於頭鼻為呼吸之所故鼻柱壞而
色惡皮膚破而潰爛也脉要精微論曰脉風成為癰
寒客於脉而不去名曰癰風或名曰寒熱

始為寒熱熱成曰癰風

新校正云按別本成一作盛

以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁

傷於風者為心風以季夏戊己傷於邪者為脾風以秋

庚辛中於邪者為肺風以冬壬癸中於邪者為腎風

春甲

乙木肝主之夏丙丁火心主之季夏戊己土脾主之秋庚辛金肺主之冬壬癸水腎主之風中五藏

六府之俞亦為藏府之風各入其門戶所中則為偏風

隨俞左右而偏風氣循風府而上則為腦風風入係頭中之則為偏風

則為目風眼寒風府穴名正入項髮際一寸大筋內宛

戶也腦戶者督脉足太陽之會故循風府而上則為腦風也足太陽之脉者起於目內眥上額交顛上入絡腦

還出故風入係頭飲酒中風則為漏風熱鬱腠理中風汗出多如液漏

故曰漏風經入房汗出中風則為內風內耗其精外開腠理因內風襲

故名曰酒風故曰內風經新沐中風則為首風沐髮中風舍於頭故曰首風久風

入中則為腸風飧泄

風在腸中上熏於胃故食不化而下出馬飧泄者食不化而出也

新校正云按全元起云飧泄者水穀不化為利

外在腠理則為泄風

風居腠理則玄府開

通風薄汗泄故云泄風

故風者百病之長也至其變化乃為他病

也無常方然致有風氣也

長先也先百病而有也校正云按全元起本及甲乙

新

經致字作故攻

帝曰五藏風之形狀不同者何願聞其診及其

病能

診謂可言之證能謂內作病形

岐伯曰肺風之狀多汗惡風色𦐇

然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白

凡

多風氣則熱有餘熱則腠理開故多汗也風薄於內故惡風馬𦐇謂薄白色也肺色白在變動為欬主藏氣風

故

內迫之故色餅然白時款短氣也晝則陽氣在表故差
暮則陽氣入裏風內應之故甚也眉上謂兩眉間之上
關庭之部所以外司肺
候故診在焉白肺色也心風之狀多汗惡風焦絕善怒

嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤

焦絕謂唇焦而文理斷絕

也何者熱則皮剝故也風薄於心則神亂故善怒而嚇
人也心脉支別者從心系上俠咽喉而主舌故病甚則
言不可快也口唇色赤故診在焉赤者肝風之狀多汗
心色也新校正云按甲乙經無嚇字

惡風善悲色微蒼噤乾善怒時憎女子診在目下其色

青肝病則心藏無養心氣虛故善悲肝合木木色蒼故
色微蒼也肝脉者循股陰入髦中環陰器抵少腹俠

胃屬肝絡膈上貫鬲布脅肋循喉嚨之後入頰頰上出
頰與督脉會於巔其支別者從目系下故噤乾善怒時

惜女子診在目脾風之狀多汗惡風身體怠墮四支下也青肝色也

不欲動色薄微黃不嗜食診在臍上其色黃

脾脉起於足上循衛

骨又上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲注心中心脉出於手循臂故身體怠墮四支不欲動而不嗜食脾氣合土主中央鼻於面部亦居中故診在馬黃脾色也新校正云按王注脾風不當引心脉出於手循臂七字於義無取脾主四支脾風則四支不欲動矣

腎風之

狀多汗惡風面疣然浮腫脊痛不能正立其色焔隱曲

不利診在肌上其色黑

疣然言腫起也焔黑色也腎者陰也目下亦陰也故腎藏受風

則面疣然而浮腫腎脉者起於足下上循腓內出臍內廉上股內後廉貫脊故脊痛不能正立也隱曲者謂隱

藏委曲之處也腎藏精外應交接今藏被風薄精氣內微故隱蔽委曲之事不通利所為也陰陽應象大論曰氣歸精精食氣今精不足則氣內歸精氣不注皮故肌皮上黑也黑腎色也胃風之狀頸多

汗惡風食飲不下鬲塞不通腹善滿失衣則腹脹食寒

則泄診形瘦而腹大

胃之脉支別者從頤後下廉過人迎循喉嚨入缺盆下鬲屬胃絡脾

其直行者從缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏至氣街中而合故頸多汗食飲不下鬲塞不通腹善滿也然失衣則外寒而中熱故腹脹食寒則寒物薄胃而物不內消故泄利胃合脾而主肉胃氣不足則肉不長故瘦也胃中風氣搖聚故腹大也新校正云按孫思邈云新食竟取風為胃風首

風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以

出內至其風日則病少愈

頭者諸陽之會風客之則皮腠疎故頭面多汗也夫人陽

氣外合於風故先當風一日則病甚以先風甚故亦先寒是以至其風日則病少愈內謂室屋之內也不可以出室屋之內者以頭痛甚而不喜外風故也

新校正云按孫思邈云新沐浴竟取風為首風

漏風之

狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風

衣常濡口乾善渴不能勞事

脾胃風熱故不可單衣腠理開疎故食則汗出甚則

風薄於肺故身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴也形勞則喘息故不能勞事

新校正云按孫思邈云因醉取

風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身熱如火臨食則汗流如雨骨節懈墮不欲自勞

泄風

之狀多汗汗出泄衣上口乾上漬其風不能勞事身

體盡痛則寒

汗上清謂皮上濕如水漬也以多汗出故爾汗多則津液涸故口中乾形勞則汗出甚

故不能勞事身體盡痛

以其汗多汗多則亡陽故寒也

新校正云按孫思邈云

新房屋竟取風為內風其狀

惡風汗流沾衣裳疑此泄風

乃內風也按本論前文先

云漏風內風首風次言入中為腸風

在外為泄風今有

泄風而無內風孫思邈載內風乃此

泄風之狀故疑此泄字內之誤也

帝曰善

痺論篇第四十三

新校正云按全元起本在第八卷

黃帝問曰痺之安生

安猶何也言何以生

岐伯對曰風寒濕三氣

雜至合而為痺也

雖合而為痺發起亦殊矣

其風氣勝者為行痺寒

氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺也

風則陽受之故為痺行寒則陰受之

故為痺痛濕則皮肉筋脉受之故為痺著
而不去也故曰痺從風寒濕之所生也
帝曰其有五

者何也

言風寒濕氣各異則三痺生有五何氣之勝也

岐伯曰以冬遇此者為

骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至陰

遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺

冬主骨春主筋夏主脉秋主皮至陰

主肌肉故各為其痺也至陰謂戊己月及土寄王月也

帝曰內舍五藏六府何氣

使然

言皮肉筋脉痺以五時之外遇然內居藏府何以致之

岐伯曰五藏皆有合病

久而不去者內舍於其合也

肝合筋心合脉脾合肉肺合皮腎合骨久病不去則

入於故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感

於邪內舍於肝脉痺不已復感於邪內舍於心脉痺不

已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺

所謂痺者各以其時重感於風寒濕之氣也時謂氣王

王春心王夏肺王秋腎王冬凡痺之客五藏者肺痺者

煩滿喘而嘔以藏氣應息又其脉還循心痺者脉不通

煩則心下鼓暴上氣而喘噎乾善噫厥氣上則恐心合

邪則脉不通利也邪氣內擾故煩也手心主心包之脉

起於胃中出屬心包下鬲手少陰心脉起於心中出屬

心系下鬲絡小腸其支別者從心系上俠咽喉其直者

復從心系却上肺故煩則心下鼓滿暴上氣而喘噎乾

也心主為噫以下鼓滿故噫之以出氣也若
是逆氣上乘於心則恐畏也神懼交弱故爾
肝痺者夜

卧則驚多飲數小便上為引如懷中夜卧則驚也肝之

脉循股陰入髀中環陰器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫
膈布脇肋循喉嚨之後上入頑顙故多飲水數小便上

引少腹如懷腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭腎者胃之
懷妊之狀

則胃氣不轉故善脹也尻以代踵謂足攀急也脊以代
頭謂身踠屈也踵足根也腎之脉起於足小指之下斜

趨足心出於然骨之下循內踝之後別入跟中以上膕
內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者

從腎上貫肝膈入肺中氣不足而受邪故脾痺者四支
不伸展新校正云詳然骨一作然谷

解墮發欬嘔汁上為大塞土王四季外主四支故四支
解墮又以其脉起於足循腓

膈上膝股也然脾脉入腹屬腎絡胃上鬲俠咽故
發欬嘔汁脾氣養肺胃復連咽故上為大塞也 腸痺

者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄大腸之脉入缺
盆絡肺下鬲屬

大腸小腸之脉又入缺盆絡心循咽下鬲抵胃屬小腸
今小腸有邪則脉不下鬲脉不下鬲則腸不行化而胃
氣積熱故多飲水而不得下出也腸胃中陽氣與邪氣
奔喘交爭得時通利以腸氣不化故時或得通則為飧
泄 胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上

為清涕

膀胱為津液之府胞內居之少腹處闕元之中
內藏胞器然膀胱之脉起於目內眥上額交巔

上入絡腦還出別下項循肩髃內俠脊抵腰中入循腎
絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫膈入脛中今胞受
風寒濕氣則膀胱太陽之脉不得下流於足故少腹膀胱
按之內痛若沃以湯澀於小便也小便既澀太陽之

脉不得下行故上燔其腦而為清涕出於鼻竅矣沃猶灌也新校正云按全元起本內痛二字作兩解陰

氣者靜則神藏躁則消亡

陰謂五神藏也所以說神藏與消亡者言人安靜不涉邪

氣則神氣寧以內藏人躁動觸冒邪氣則神被害而離散藏無所守故曰消亡此言五藏受邪之為痺也飲

食自倍腸胃乃傷

藏以躁動致傷府以飲食見損皆謂過用越性則受其邪此言六府受邪

之為痺也淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺

溺痺聚在腎淫氣之竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾

淫氣謂氣之妄行者各隨藏之所主而入為痺也新校正云詳從上凡痺之客五藏者至此全元起本在陰陽

別論中此王諸痺不已亦益內也從外不去則益其風

氏之所移也

氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者或疼久者或

易已者其故何也岐伯曰其入藏者死其留連筋骨間

者疼久其留皮膚間者易已

入藏者死以神去也筋骨疼久以其定也皮膚易已

以浮淺也由斯深淺故有是不同

帝曰其客於六府者何也岐伯曰此

亦其食飲居處為其病本也

四方雖土地溫涼高下不同物性剛柔食居不異但

動過其分則六府致傷陰陽應象大論曰水穀之寒熱感則害六府新校正云按傷寒論曰物性剛柔食居

亦異六府亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞

而入各舍其府也

六府俞亦謂背俞也膽俞在十椎之傍胃俞在十二椎之傍三焦俞在十

三椎之傍大腸俞在十六椎之傍小腸俞在十八椎之傍
膀胱俞在十九椎之傍隨形分長短而取之如是各去

脊同身寸之一寸五分並足太陽脉氣之所發也
新校正云詳六府俞並在本椎下兩傍此注言在椎之傍

者文
帝曰以鍼治之柰何歧伯曰五藏有俞六府有合

循脉之分各有所發各隨其過

新校正云按甲乙經隨作治

則病瘳

也
肝之俞曰太衝心之俞曰太陵脾之俞曰太白肺之

俞曰太淵腎之俞曰太谿皆經脉之所注也太衝在
足大指間本節後二寸陷者中
新校正云按刺腰痛

注云太衝在足大指本節後內間二寸陷者中動脉應
手刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

太陵在手掌後骨兩筋間陷者中刺可入同身寸之六
分留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側核骨下陷
者中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

太淵在手掌後陷者中刺可入同身寸之二分留二呼
若灸者可灸三壯太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者
中刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯也
胃合入于三里膽合入于陽陵泉大腸合入于曲池小
腸合入于小海三焦合入于委陽膀胱合入于委中三
里在膝下三寸斷外廉兩筋間刺可入同身寸之一寸
留七呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下一寸斷外廉
陷者中刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三
壯小海在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得
之刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯曲
池在肘外輔屈肘曲骨之中刺可入同身寸之五分留
七呼若灸者可灸三壯委陽在足脛中外廉兩筋間刺
可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯屈伸而
取之委中在脛中央約文中動脈刺可入同身寸之五
分留七呼若灸者可灸三壯
新扶正云按刺熱注委
中在足膝後屈處餘並同此
故經言循脈之分各有所

發各隨其過則病瘳也過謂脉所經過處新校正云詳王氏以委陽為三焦之合按甲乙經云委陽三焦下輔俞也足太陽之別絡三焦之合自在手少陽經天井穴為少陽脉之所入為合詳此六府之合俱引本經所入之穴獨三焦不引本經所入之穴者王氏之誤也王氏但見甲乙經云三焦合于委陽彼說自異彼又以大腸合于巨虛上廉小腸合于下廉此以曲池小海易之故知當以天井穴為合也帝曰榮衛之

氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五

藏灑陳於六府乃能入於脉也

正理論曰穀入於胃脉道乃行水入於經其血

乃成又靈樞經曰榮氣之道內穀為實新校正云按別本實作實穀入於胃氣傳與肺精專者上行經隧由此故水穀精氣合榮故循脉上下貫五藏絡六府也行榮氣運行而入於脉也

脉内故無所不至

衡者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入

於脉也

悍氣謂浮盛之氣也以其浮盛之氣故慄疾滑利不能入於脉中也

故循皮膚之

中分肉之間熏於肓膜散於胃腹

皮膚之中分肉之間謂脉外也肓膜為五

藏之間肓中膜也以其浮盛故能布散於胃腹之中空虛之處熏其肓膜令氣宣通也

逆其氣則

病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺帝曰善痺

或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐

伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也

風寒濕氣客於肉分之間迫切而為沫得

寒則聚聚則排分肉肉裂則痛故有寒則痛也

其不痛不仁者病久入深榮衛

之行瀋經絡時踈故不通

新校正云按甲乙經不通作不痛詳甲乙經此條之不痛

與不仁兩事後言不痛是再明不痛之為重也

皮膚不營故為不仁

不仁者皮頑不知有

無也其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也

病本生於風寒濕氣

故陰氣益之也

其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故為痺

熱遭遇也

言遇於陰氣陰氣不勝故為熱

其多汗而濡者

此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡

也則中表相應也

帝曰夫痺之為病不痛何也歧伯曰痺在

於骨則重在於脉則血凝而不流在於筋則屈不伸在

於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也凡痺

之類逢寒則蟲逢熱則縱帝曰善

蟲謂皮中如蟲行縱謂縱緩不相就新

校正云按甲

乙經蟲作急

痿論篇第四十四

新校正云按全元起本在第四卷

黃帝問曰五藏使人痿何也

痿謂痿弱無力以運動

歧伯對曰肺

主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜

新校正云按全元起

本云膜者人皮下肉上筋膜也

脾主身之肌肉腎主身之骨髓

所主不同痿生

亦各歸其所主

故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿癰也

雙謂掌雙足不得伸以行心氣熱則下脉厥而上上則也肺熱則腎受熱氣故爾

下脉虛虛則生脉痿樞折挈脛縱而不任地也

心熱或則火獨

光火獨光則內炎上腎之脉常下行今火盛而上炎用事故腎脉亦隨火炎燔而逆上行也陰氣厥逆火復內燔陰上隔陽下不守位心氣通脉故生脉痿腎氣主足故膝腕樞紐如折去而不相提挈脛筋縱緩而不能任地也肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣

發為筋痿

膽約肝葉而汁味至苦故肝熱則膽液滲泄膽病則口苦今膽液滲泄故口苦也肝主筋

膜故熱則筋膜乾而攣急發為筋痿也八十一難經曰膽在肝短葉間

脾氣熱則胃乾而

渴肌肉不仁發為肉痿

脾與胃以膜相連脾氣熱則胃液滲泄故乾而且渴也脾主肌

肉今熱薄於內故肌腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減

發為骨痿

腰為腎府又腎脉上股內貫脊屬腎故腎氣熱則腰脊不舉也腎主骨髓故熱則骨枯而

髓減發則為骨痿

帝曰何以得之岐伯曰肺者藏之長也為心

之蓋也

位高而布葉於胃中是故為藏之長心之蓋

有所失亡所求不得則

發肺鳴鳴則肺熱葉焦

志苦不暢氣鬱故也肺藏氣氣鬱不利故喘息有聲而肺熱葉

也故曰五藏因肺熱葉焦發為痿躄此之謂也

肺者所以行榮

衛治陰陽故引曰五藏因肺熱而發為痿躄也

悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則

陽氣內動發則心下崩數溲血也

悲則心承急肺布葉舉而上焦不通榮衛

不散熱氣在中故胞絡絕而陽氣內鼓動發則心下崩
數澁血也心下崩謂心包內崩而下血也澁謂溺也

新校正云按楊上善云胞絡者心上胞絡之脉也詳經注中胞字俱當作包全本胞又作肌也故本病

曰大經空虛發為肌痺傳為脉痿

本病古經論篇名也以

心崩澁血故大經空虛脉空則熱內薄衛氣盛榮氣微
故發為肌痺也先見肌痺後漸脉痿故曰傳為脉痿也

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發

為筋痿及為白淫

思想所願為所欲也施寫勞損故為
筋痿及白淫也白淫謂白物淫行如

精之狀男子因澁而下女子陰器中熱澁而下也

故下經曰筋痿者生於肝使

內也

下經上古之經名也使內
謂勞役陰力費竭精氣也

有漸於濕以水為事若

有所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿

業惟近濕

居處澤下皆水為事也平者久而猶怠感之者尤甚矣肉屬於脾脾氣惡濕濕著於內則衛氣不榮故肉為痿

也故下經曰肉痿者得之濕地也

陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮肉

筋脉此之謂害肉也

有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐

內伐則熱舍於腎腎者水藏也今水不勝火則骨枯而

髓虛故足不任身發為骨痿

陽氣內伐謂伐腹中之陰氣也水不勝火以熱舍於

腎中故下經曰骨痿者生於大熱也

腎性惡燥熱反居中熱薄骨乾故骨

痿無帝曰何以別之歧伯曰肺熱者色白而毛敗心熱

者色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而

肉蠕動腎熱者色黑而齒槁

各求藏色及所主養而命之則其應也

帝曰

如夫子言可矣論言治痿者獨取陽明何也歧伯曰陽

明者五藏六府之海

陽明胃脉也胃為水穀之海也

主閏宗筋宗筋主

束骨而利機關也

宗筋謂陰髀中橫骨上下之豎筋也上絡胃腹下貫髀尻又經於背腹上

頭項故云宗筋主束骨而利機關也然腰者身之大關節所以司屈伸故曰機關

衝脉者經脉

之海也

靈樞經曰衝脉者十二經之海

主滲灌谿谷與陽明合於宗筋

尋此則橫骨上下齊兩傍豎筋正宗筋也衝脉循腹俠齊傍各同身寸之五分而上陽明脉亦俠齊傍各同身

寸之一寸五分而上宗筋脉於中故云與陽明合於宗筋也以為十二經海故主滲灌谿谷也肉之大會為谷

小會為谿新校正云詳宗筋脉於中一作宗筋縱於中陰陽總宗筋之會會於氣

街而陽明為之長皆屬於帶脉而絡於督脉宗筋脉會於橫骨

之中從上而下故云陰陽總宗筋之會也宗筋俠齊下合於橫骨陽明輔其外衛脉居其中故云會於氣街而

陽明為之長也氣街則陰髦兩傍脉動處也帶脉者起於季脇回身一周而絡於督脉也督脉者起於闕元上

下循腹故云皆屬於帶脉而絡於督脉也督脉任脉衛脉三脉者同起而異行故經文或參差而引之故

陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也陽明之脉從缺盆下

乳內廉下俠齊至氣街中其支別者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀抵伏兔下入膝腘中下循衛

外廉下足跗入中指內間其支別者下膝三寸而別以下入中指外間故陽明虛則宗筋縱緩帶脉不引而足痿弱不可用也引謂牽引帝曰治之柰何歧伯曰各補其榮而通其

俞調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則病

已矣帝曰善

時受月謂受氣時月也如肝王甲乙心王丙丁脾王戊己肺王庚辛腎王壬癸皆王

氣法也時受月則正謂五常受氣月也

厥論篇第四十五

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰厥之寒熱者何也

厥謂氣逆上也世謬傳為脚氣廣設方論焉

歧

伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥

陽謂足之三陽脉陰謂足之三陰脉下謂足也帝曰熱厥之為熱也必起於足

下者何也

陽主外而厥在內故問之

岐伯曰陽氣起於足五指之表

陰脉者集於足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也

大約而言之足太陽脉出於足小指之端外側足少陽脉出於足小指次指之端足陽明脉出於足中指及大指之端並循足陽而上肝脾腎脉集於足下聚於足心陰弱故足下熱也新校正云按甲乙經陽氣起於足

作走於足起當作走

帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者

何也

陰主內而厥在外故問之

岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝

下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也

不從外皆從內也

亦大約而言之也足太陰脉起於足大指之端內側足厥陰脉起於足大

指之端三毛中足少陰脉起於足小指之下斜趣足心並循足陰而上循股陰入腹故云集於膝下而聚於膝

之上也帝曰寒厥何失而然也歧伯曰前陰者宗筋之所

聚太陰陽明之所合也

宗筋俠齊下合於陰器故云前陰者宗筋之所聚也太陰者脾

脉陽明者胃脉脾胃之脉皆輔近宗筋故云太陰陽明之所合新校正云按甲乙經前陰者宗筋之所聚作

厥陰者衆筋之所聚全元起云前陰者厥陰也與王注義異亦自一說

春夏則陽氣多而

陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰

此乃天之常道

此人者質壯

以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因

從之而上也

質謂形質也奪於所用謂多欲而奪其精氣也

氣因於中

新校正云按甲

乙經氣因於中作所中

陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣

獨在故手足為之寒也帝曰熱厥何如而然也

朔其所由爾

歧伯曰酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主為胃行其

津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和

則精氣竭精氣竭則不營其四支也

前陰為太陰陽明之所合故胃不和

則精氣竭也內精不足故四支無氣以營之

此人必數醉若飽以入房氣聚

於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱偏於

身內熱而溺赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰陽氣獨

勝故手足為之熱也

醉飽入房內亡精氣中虛熱入由是腎衰陽盛陰虛故熱生於手足

也帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠

至一日乃知人者何也

暴猶卒也言卒然胃悶不醒覺也

或謂尸厥岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣

盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則

不知人也

陰謂足太陰也盛於上五字作腹滿二字當從甲乙經之

新校正云按甲乙經陽氣

說何以言之別按甲乙經云陽脈下墜陰脈上爭發尸厥為有陰氣盛於上而又言陽氣盛於上又按張仲景

云少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃鬲宗
氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身
不仁此為尸厥仲景言陽氣退下則是陽氣不得盛於
上故謂當從甲乙經也又王注陰謂足太陰亦為未盡
按經刺論云邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五
絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而
形無知其狀若尸或曰尸帝曰善願聞六經脈之厥狀
厥焉得專解陰為太陰也

病能也

為前問解故請

岐伯曰巨陽之厥則腫首頭重

足不能行發為眴仆

巨陽太陽也足太陽脈起於目內
眴上額交巔上其支別者從巔至

耳上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩髃內
俠脊抵腰中入循督絡腎屬膀胱其支別者從腰中下
貫髀入膕中其支別者從髀內左右別下貫腓過解
循解外復原下合膕中以下貫膕內出外踝之後循京

骨至小指之端外側由是厥陽明之厥則癰疾欲走呼
逆外形斯證也腫或作踵非

腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言

足陽明脉起於鼻交頰中下循鼻外

入上齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下廉出
大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙其支別
者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下鬲屬胃絡脾其直
行者從缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別者起
胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀抵伏兔下入
膝腘中下循胫外廉下足跗入中指內間其支別者下
膝三寸而別以下入中指外間其支別者跗上少陽之
八大指間出其端故厥如是也癰一為顙非
厥則暴聾頰腫而熱脇痛胛不可以運
足少陽脉起於目銳眥上抵頭
角下耳後循頸行手少陽之前至肩上交出手少陽之
後入缺盆其支別者從耳後入耳中出走耳前至目銳

背後其支別者目銳眇下大迎合手少陽於頰下加頰
車下頸合缺盆以下胷中貫鬲絡肝屬膽循脇裏出氣
街透髮際橫入髀厭中其直行者從缺盆下抵循胃過
季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下入外輔骨
之前直下抵絕骨之端下出外踝之前
循足跗出小指次指之端故厥如是 太陰之厥則腹

滿臍脹後不利不欲食食則嘔不得卧

足太陰脉起於大指之端上膝

股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲注心中故厥如是

少陰

之厥則口乾溺赤腹滿心痛

足少陰脉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直行者

從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支別者從肺出絡心注胷中故厥如是

厥陰之厥則

少腹腫痛腹脹溼洩不利好卧屈膝陰縮腫脣內熱

足厥

陰脉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股陰入髦中下環陰器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫鬲

故厥如是矣
肝內熱一本云
肝外熱傳寫行書內外誤也

盛則瀉之虛則補之不盛

不虛以經取之

不盛不虛謂邪氣未盛真氣未虛如是則以兗俞經法留呼多少而取之

太

陰厥逆衝急掌心痛引腹治主病者

足太陰脉起於大指之端循指內側

上內踝前廉上膈內循衝骨後上膝股內前廉入腹其支別者復從胃別上鬲注心中故衝急掌心痛引腹也

太陰之脉行有左右候其有過者當發取之故言治主病者
新校正云詳從太陰厥逆至篇末全元起本在

第九卷王少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

以其

腎上貫肝鬲入肺
中循喉嚨故如是
厥陰厥逆掌腰痛虛滿前閉譫言

新

正云按全元起云譔言者氣虛獨言也

治主病者

以其脉循股陰入髀中環陰器復上循喉嚨之

後絡舌本故如是

新校正云按甲乙經厥陰之經不絡舌本王氏注刺熱篇刺腰痛篇并此三注俱云絡舌

本又注風論痺論各不云絡舌本

王注自有異同當以甲乙經為正三陰俱逆不得前後

使人手足寒三日死

三陰絕故

太陽厥逆僵仆嘔血善

衄治主病者

循其脉起目內眥又循脊絡腦故如是

少陽厥逆機關不利

機關不利者腰不可以行項不可以顧

以其脉循頸下繞髮際橫入解

厥中故發腸癰不可治驚者死

足少陽脉貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街發脇

如是癰則經氣絕故不可治驚者死也

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血

其

脈循喉嚨入缺盆下
手太陰脈起於中焦下絡大腸
手太陰脈逆虛滿而欬善嘔沫治

主病者

手太陰脈起於中焦下絡大腸
還循胃口上膈屬肺故如是

手心主少陰厥

逆心痛引喉身熱死不可治

手心主脈起於胃中出屬
心包手少陰脈其支別者

從心系上俠
咽喉故如是

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不

可以俛仰治主病者

手太陽脈支別者從缺盆循頸上頰
至目銳眦却入耳中其支別者從頰

上頰抵鼻至目內眦故耳聾泣出項不可以
顧也腰不可以俛仰脈不相應恐古錯簡文

手陽明少

陽厥逆發喉痺噤腫瘰治主病者

手陽明脈支別者從
缺盆上頸手少陽脈

支別者從腫中上出缺盆上項故如是
新校正云按全元起本瘰作瘰

黃帝內經素問卷十二

黃帝內經素問卷十二音釋

風論癘

利音潰

胡對切

腦

奴皓切

痺論育

荒音

痿論躄

必亦切

髀

寬音尻

枯焚切

摠

總音臍

厥論顛

於交切

也

譫

詹音僵

仆

赴音髦

毛音

欽定四庫全書

以經方
卷十二音釋

黃帝內經素問卷十二音釋